


BOLLETTINO VITE n° 9 del 12/05/2022 - GENOVA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




TENDENZA

GIORNO	15/05/2022	16/05/2022
PREVISIONE	Variabilità	Soleggiato
TEMPERATURE	stazionarie	in aumento
INTENSITÀ VENTI	deboli	deboli
AFFIDABILITÀ	Media	Media


Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdf/WS/bollettinoLiguria.pdf>

Le temperature massime hanno registrato un importante aumento a metà settimana, con un rialzo dei valori da circa 16°C

fino a raggiungere i 27°C (in particolare nell'areale di Ponente). Anche le minime sono aumentate a metà settimana, per poi tornare ai valori iniziali (mediamente 12/13°C). Precipitazioni modeste nei giorni 5 e 6 maggio, che non hanno raggiunto i 5 mm di cumulo.



FENOLOGIA—rilievi del 09/05



In **costa** e nei versanti meglio esposti del **primo entroterra** le infiorescenze dei principali vitigni mostrano i bottoni fiorali ben separati (BBCH 57).

Nelle **zone interne** la fenologia risulta più arretrata e la fase prevalente è la BBCH 55, in cui i grappoli si distanziano lungo il germoglio.

Foto Dr. L. Calcagno:
Bianchetta a Castiglione Chiavarese



Maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite al link
http://bit.ly/BBCH_Vite2019

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE** e **PERONOSPORA della VITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022.

Link: <https://tinyurl.com/RLoidio> e <http://bit.ly/RLperonospora>

Elenchi aggiornati dei commerciali ammessi dal Disciplinare per:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Escoriosi: <https://tinyurl.com/RLcomesoriosi>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA – le recenti piogge hanno determinato in alcune zone condizioni favorevoli al patogeno. Considerato lo sviluppo delle piante, la prossimità alla fioritura, soprattutto in costa e nei vigneti più precoci, al termine del periodo di efficacia dell'eventuale precedente trattamento è opportuno mantenere protetta la vegetazione con prodotti specifici e a maggior persistenza. I prodotti utilizzabili in questa fase possono essere a base di **dimetomorf**, **cyazofamid**, **mandipropamid**, **fluopicolide**, **oxathiapiprolin** (es. *Forum*, *Quasar*, *Mildicut*, *Cuprofix*, *Ampexio*, *Zorvec vinabel*). E' importante attenersi sempre al numero massimo di interventi ammessi per principio attivo e alternare i prodotti. Per coloro che si trovasse con una vegetazione in forte sviluppo e senza alcun trattamento ancora eseguito, potrebbe essere opportuno utilizzare prodotti ad azione sistemica come **metalaxil M** abbinati a **rame** (es. *Ridomil Gold R*, *Flare Gold R*, *Mexil R*). Nelle aree più interne, dove la vegetazione è più contenuta è possibile utilizzare **fosetil-Al** o **fosfonati** abbinati a prodotti di copertura come **rame** (es. *Optix R*, *Erresei Bordeaux*, *Tutor*) o **metiram** (es. *Polyram DF*), soprattutto nel caso di vigneti soggetti a black rot ed escoriosi, in quanto assicura un'azione collaterale anche per tali patologie.

OIDIO – considerando la fase fenologica, è bene abbinare al trattamento antiperonosporico **zolfo bagnabile o liquido**, e nel caso di zone maggiormente soggette ad oidio e con vegetazione più sviluppata, prodotti specifici come **fluxapyroxad** (es. *Sercadis*) o ad azione sistemica come gli **IBE** (es. *Topas*, *Domark*, *Score*) anche per garantire un analogo periodo di efficacia.

AZIENDE BIOLOGICHE – mantenere protetta la vegetazione con prodotti a base di **rame** e **zolfo bagnabile o liquido**. In caso di aree particolarmente sensibili a oidio è possibile alternare i trattamenti liquidi con quelli con zolfo in polvere, eventualmente in miscela con zeolite, sostanza caratterizzata da elevata capacità di assorbimento dell'umidità.

GESTIONE VIGNETO: è opportuno procedere con le operazioni di gestione dei germogli (diradamento di quelli in sovrannumero, doppi o sterili) e di spollonatura in zona costiera e primo entroterra al fine di riequilibrare la pianta e migliorare l'efficacia dei trattamenti. Si consiglia inoltre, se ancora non fatto, di eseguire le operazioni di trinciatura o sfalcio delle erbe spontanee o l'innaffiamento di eventuali leguminose.

>> PSR 2014-2020. L'elenco di tutti i bandi aperti è disponibile al link: <https://tinyurl.com/bandiaperti>

>> Sottomisura 17.1 Campagna assicurativa 2022. Info al link <https://tinyurl.com/campagna assicurativa>