REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo

PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA

Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 14 del 16/06/2022 - GENOVA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov





TENDENZA

GIORNO	19/06/2022	20/06/2022
PREVISIONE	Sereno	Sereno
TEMPERATURE	Stazionarie	In diminuzione
INTENSITÀ VENTI	Deboli	Deboli
AFFIDABILITÀ	Alta	Media

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su: https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf



Massime lievemente altalenanti con valori compresi tra i 28 e i 32°C. Minime più lineari e in progressivo aumento negli ultimi giorni (raggiunti valori tra i 18 e i 21 °C nelle stazioni in esame). Precipitazioni assenti.

FENOLOGIA—*rilievi del 13/06*



In **costa** e nelle zone più calde del **primo entroterra** gli acini hanno raggiunto la dimensione di un pisello (BBCH75), mentre la Bianchetta ha concluso la chiusura del grappolo (BBCH77).

Nelle **zone interne** la fase fenologica prevalente è la BBCH73, con gli acini della misura di un grano di pepe.

Foto Dr. L. Calcagno: Ciliegiolo a Sestri Levante

Maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite al link http://bit.ly/BBCH_Vite2019

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA – l'assenza di precipitazioni e le alte temperature di questi giorni riducono notevolmente il rischio e non rendono necessari interventi specifici.

OIDIO - Considerando la fase fenologica ad elevato rischio, si raccomanda di utilizzare zolfo bagnabile o liquido ad alto dosaggio preferibilmente alternato a zolfo in polvere su vegetazione asciutta e nelle ore più fresche della giornata. Nelle aree più predisposte mantenere la protezione impiegando zolfo bagnabile o liquido associato a prodotti specifici di buona persistenza.

TIGNOLETTA E TIGNOLA RIGATA – è possibile visualizzare l'andamento delle catture al seguente link: https://tinyurl.com/RLcattureGE

BOTRITE- le condizioni meteo non risultano favorevoli al patogeno e le operazioni di potatura verde eseguite nella fascia produttiva come la sfemminellatura e sfogliatura contribuiscono a contenere il patogeno; in questa fase è possibile utilizzare alcuni prodotti ad azione preventiva di origine naturale che agiscono per antagonismo, quali **Bacillus subtilis** *(Serenade ASO),* **Bacillus amyloliquefaciens** *(Amylo-X)*, **Aureobasidium pullulans** (*Botector New*), **Trichoderma atroviride** (*Vintec*), oppure **Cerevisane** (*Romeo*) che agisce come induttore di resistenza.

AZIENDE BIOLOGICHE: in questa fase fenologica molto sensibile all'oidio è importante mantenere la copertura con **zolfo** bagnabile o liquido, alternando preferibilmente con zolfo in polvere, particolarmente efficace in fase di chiusura grappolo. In alternativa allo zolfo è possibile utilizzare **bicarbonato di potassio** (*Armicarb 85, Karma 85 o Vitikappa*) che ha anche un effetto antibotritico.

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE**, **PERONOSPORA della VITE** e **TIGNOLETTA** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022. Link: https://tinyurl.com/RLoidio http://bit.ly/RLperonospora e https://bit.ly/RL-tignoletta

Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- Peronospora: https://tinyurl.com/RLcomperonospora
- Tignoletta: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta

E' stata recentemente revisionata la **SCHEDA TECNICA BOTRITE.** Link: https://tinyurl.com/botrite con il relativo elenco dei commerciali ammessi: https://tinyurl.com/RLcommbotrite

>> Giornate fitopatologiche 2022: info ed iscrizioni al link: http://www.giornatefitopatologiche.it

VIROSI E GIALLUMI -Si ricorda che in questo periodo è possibile notare nei vigneti piante con vegetazione stentata, colpite da virosi e giallumi. Pertanto si consiglia, per entrambe le patologie, di **segnare** le piante sintomatiche, così da poterle verificare ed estirpare successivamente.

POTATURA VERDE—Si raccomanda di arieggiare la zona grappoli mediante sfogliatura (le foglie poste in ombra), di eseguire una sfemminellatura sempre in tale zona e, dove necessario, cimature.

IRRIGAZIONE— I modelli di stima dei fabbisogni evidenziano la necessità di irrigare in ogni tipo di terreno e in tutte le zone viticole provinciali, sebbene in modo diversificato. Maggiori dettagli alla pagina dedicata al consiglio irriguo sul SIA: https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Irrigazione

LABO-CAAR -Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - **tel** 0187.278770- **fax** 0187.278785
e-mail caarservizi@regione.liguria.it– **Web** www.agriligurianet.it, https://sia.regione.liguria.it

www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot