


BOLLETTINO VITE n° 15 del 23/06/2022 - GENOVA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




TENDENZA


GIORNO	26/06/2022	27/06/2022
PREVISIONE	Soleggiato	Soleggiato
TEMPERATURE	In deciso aumento	In ulteriore aumento
INTENSITÀ VENTI	Deboli o moderati	Moderati o forti
AFFIDABILITÀ	Bassa	Bassa

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>

Temperature massime in lieve aumento a inizio periodo, con un passaggio da 28 a 32°C circa, seguito da un calo fino a 27°C che nell'areale di ponente è stato più immediato, avvenendo il 20/6, ossia due giorni prima dell'altra costa. Minime che mostrano circa due gradi di differenza tra levante e ponente (con quest'ultimo più fresco), fino al 22/6 in cui questa discrepanza si è conclusa portando entrambi gli areali intorno ai 21°C. Precipitazioni praticamente assenti.



FENOLOGIA—rilevi del 20/06



In **costa** e nelle zone più calde del **primo entroterra** la maggior parte dei vitigni mostra grappoli in fase di chiusura (BBCH77), con le varietà a grappolo compatto (*Bianchetta*) già in fase di completa chiusura (BBCH79). Nelle **zone interne** la fase fenologica prevalente è la BBCH75, con gli acini della misura di un pisello.

Foto Dr. L. Calcagno: Moscato a castiglione Chiavarese

Maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite al link http://bit.ly/BBCH_Vite2019



POTATURA VERDE—Si **raccomanda** di arieggiare la zona grappoli mediante sfogliatura (le foglie poste in ombra, evitando di esporre troppo il grappolo a irraggiamento diretto) e di eseguire sfemminellatura e cimature.

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE** **OIDIO DELLA VITE**, **PERONOSPORA** della VITE, **TIGNOLETTA** e **BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022. Link: <https://tinyurl.com/RLoidio> - <http://bit.ly/RLperonospora> - <https://bit.ly/RL-tignoletta> e <https://tinyurl.com/botrite>

Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- Tignoletta: <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>
- Botrite: <https://tinyurl.com/RLcommbotrite>

>> Dichiarato lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÀ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria: è vietato l'abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto <https://tinyurl.com/RLincendi>

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA – le alte temperature del periodo e la mancanza di bagnature prolungate nella maggior parte dei vigneti hanno contenuto fortemente lo sviluppo di infezioni e non si sono rilevati sintomi; in previsione di piogge è possibile rinnovare la copertura con **rame**.

OIDIO - la pressione del patogeno continua ad essere elevata; si raccomanda quindi di utilizzare **zolfo** bagnabile o liquido ad alto dosaggio preferibilmente alternato a zolfo in polvere su vegetazione asciutta e nelle ore più fresche della giornata. Nelle aree più predisposte mantenere la protezione impiegando zolfo bagnabile o liquido associato a prodotti specifici di buona persistenza; nelle zone in cui si sono rilevati sintomi su grappolo utilizzare prodotti ad azione bloccante, ad esempio **spiroxamina** (es. *Prosper*), al termine del periodo di copertura del precedente trattamento.

TIGNOLETTA E TIGNOLA RIGATA – catture in aumento, è possibile visualizzare l'andamento ed i riferimenti alla scheda tecnica con le strategie di difesa al link: <https://tinyurl.com/RLcattureGE>

BOTRITE- le condizioni meteo non sono state favorevoli al patogeno e le operazioni di potatura verde eseguite nella fascia produttiva come la sfemminellatura e la sfogliatura, assieme all'utilizzo di prodotti rameici o alcuni antioidici per la difesa, sono misure generalmente sufficienti a contenere il patogeno.

AZIENDE BIOLOGICHE: in questa fase fenologica molto sensibile all'oidio è importante mantenere la copertura con **zolfo** bagnabile o liquido, alternando preferibilmente con zolfo in polvere, particolarmente efficace in fase di chiusura grappolo. In alternativa allo zolfo è possibile utilizzare **Bicarbonato di potassio** (*Armicarb 85*, *Karma 85* o *Vitikappa*) che ha anche un effetto antibotritico, o, in assenza di sintomi **Laminarina** (*Vacciplant*); in presenza invece di infezioni, utilizzare olio essenziale di arancio dolce (*Prev-am Plus*). Per peronospora in previsione di pioggia è opportuno rinnovare la copertura con **rame**.

VIROSI E GIALLUMI—Si ricorda che in questo periodo è possibile notare nei vigneti piante con vegetazione stentata, colpite da virus e giallumi. Pertanto si consiglia, per entrambe le patologie, di **segnare** le piante sintomatiche, così da poterle estirpare successivamente.

IRRIGAZIONE— I modelli di stima dei fabbisogni evidenziano la necessità di irrigare in ogni tipo di terreno e in tutte le zone viticole provinciali, sebbene in modo diversificato. Tenere conto di eventuali ordinanze comunali. Maggiori dettagli alla pagina dedicata al consiglio irriguo sul SIA: <https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Irrigazione>