


BOLLETTINO VITE n° 16 del 30/06/2022 - GENOVA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




TENDENZA

GIORNO	03/07/2022	04/07/2022
PREVISIONE	Sereno	Sereno
TEMPERATURE	In aumento	In aumento
INTENSITÀ VENTI	deboli	deboli
AFFIDABILITÀ	Media	Media

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>


Temperature massime in aumento, seppur altalenanti, fino al 27/6 con valori che dai 25-28°C sono saliti fino a 35°C, per poi calare nuovamente a circa 30°C a fine periodo.

Minime costanti con valori che non si sono mai troppo discostati tra i 18-21°C nei due rispettivi areali. Precipitazioni lievi, con valori massimi di cumulo intorno a circa 4 mm concentrati nella giornata del 28/6.



IN CAMPO

FENOLOGIA—rilievi del 27/06



In **costa** e nelle zone più calde del **primo entroterra** i vitigni hanno concluso la chiusura del grappolo (BBCH79); lievemente più arretrata la fenologia del Vermentino. Nelle **zone interne** la fase fenologica prevalente è la BBCH77, in cui si osservano gli acini che iniziano a toccarsi.

Foto Dr. L. Calcagno: Bianchetta a Genova

Maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite al link
http://bit.ly/BBCH_Vite2019



POTATURA VERDE—Si raccomanda di arieggiare la zona grappoli mediante sfogliatura (le foglie poste in ombra, evitando di esporre troppo il grappolo a irraggiamento diretto) e di eseguire sfemminellatura e cimature.

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE** **OIDIO DELLA VITE, PERONOSPORA della VITE, TIGNOLETTA e BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022. Link:
<https://tinyurl.com/RLoidio> - <http://bit.ly/RLperonospora> -
<https://bit.ly/RL-tignoletta> e <https://tinyurl.com/botrite>

Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- Tignoletta: <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>
- Botrite: <https://tinyurl.com/RLcommbotrite>

>> Dichiarato lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÀ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria: è vietato l'abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto <https://tinyurl.com/RLincendi>

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA – le recenti piogge e le successive bagnature potrebbero aver favorito l'attività del patogeno; nel caso non si sia già intervenuti di recente, è opportuno rinnovare la protezione utilizzando **rame** anche in associazione a prodotti di maggiore persistenza quali **amectotradina** e **zoxamide** (es. *Enervin SC*, *Electis R Flow*) nelle zone di fondo valle o comunque più sensibili al patogeno.

OIDIO – al termine del periodo di copertura del precedente trattamento, rinnovare la protezione con zolfo bagnabile/liquido preferibilmente alternato a zolfo in polvere su vegetazione asciutta e nelle ore più fresche della giornata. Nelle aree più predisposte mantenere la protezione impiegando zolfo bagnabile o liquido associato a prodotti specifici di buona persistenza, eventualmente utilizzando **spiroxamina** in presenza di sintomi.

BOTRITE– gli interventi con prodotti rameici o alcuni antioidici per la difesa, insieme alle operazioni di potatura verde, attualmente risultano misure sufficienti a contenere il patogeno.

TIGNOLETTA E TIGNOLA RIGATA – catture in diminuzione per tignoletta, costanti per rigata; al momento non si consigliano trattamenti. Si ricorda che alcuni principi attivi utilizzabili per il secondo trattamento contro la cicalina vettore della flavescenza dorata (da effettuare circa nella prima decade di luglio) sono efficaci anche nei confronti della tignoletta. E' possibile visualizzare l'andamento delle catture ed i riferimenti alla scheda tecnica con le strategie di difesa al link: <https://tinyurl.com/RLcattureGE>

AZIENDE BIOLOGICHE: è importante mantenere la copertura con **zolfo** bagnabile o liquido, alternando preferibilmente con zolfo in polvere, particolarmente efficace in fase di chiusura grappolo. In alternativa allo zolfo è possibile utilizzare **bicarbonato di potassio** (*Armcarb 85*, *Karma 85* o *Vitikappa*) che ha anche un effetto antibotritico, o, in assenza di sintomi **laminarina** (*Vacciplant*); in presenza invece di infezioni, utilizzare **olio essenziale di arancio dolce** (*Prev-am Plus*). Per peronospora dopo le recenti piogge è opportuno ripristinare la copertura con **rame**, anche in associazione a corroboranti (es. *zeolite*), che consentono di ridurre il dosaggio, aumentando al contempo la protezione del grappolo da marciumi.

VIROSI E GIALLUMI—Si ricorda che in questo periodo è possibile notare nei vigneti piante con vegetazione stentata, colpite da virosi e giallumi. Pertanto si consiglia, per entrambe le patologie, di **segnare** le piante sintomatiche, così da poterle estirpare successivamente.

IRRIGAZIONE—tenendo conto delle recenti precipitazioni, valutare la necessità di interventi, considerando le specifiche situazioni e la stima dei fabbisogni individuati alla pagina dedicata al consiglio irriguo sul SIA: <https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Irrigazione>