


BOLLETTINO VITE n° 19 del 21/07/2022 - GENOVA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




TENDENZA

GIORNO	24/07/2022	25/07/2022
PREVISIONE	Soleggiato ☀️	Nuvolosità variabile ☁️
TEMPERATURE	In aumento	In aumento
INTENSITÀ VENTI	Deboli o moderati	Deboli
AFFIDABILITÀ	Media	Bassa

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>

Le temperature massime hanno registrato un aumento da metà periodo, passando da valori già alti intorno ai 31-32°C fino a raggiungere, segnatamente per l'areale di ponente, quasi 39°C per poi normalizzarsi intorno ai 36°C. Le minime hanno seguito lo stesso andamento, passando da circa 22°C a valori di ben 27°C. Precipitazioni praticamente assenti, che non hanno comunque superato i 2 mm di cumulato in data 17/7.



IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA – l'attuale situazione caratterizzata da elevate temperature continua ad essere sfavorevole per il patogeno e non rende necessari trattamenti. Nelle zone più interne caratterizzate da elevata umidità si sono rilevati alcuni sporadici sintomi; in occasione del trattamento antiodico si consiglia quindi di valutare l'aggiunta di **rame a basso dosaggio** nel caso in cui la vegetazione non sia protetta.

OIDIO – per quanto le temperature diurne particolarmente elevate siano sfavorevoli al patogeno, persistono sintomi di infezione su foglia, con incidenza molto variabile, e si notano non di rado imbrunimenti con macchie tipiche su grappolo; è consigliabile quindi mantenere protetta la vegetazione e in particolare i grappoli con **zolfo bagnabile** o liquido ad alto dosaggio. In caso di infezione attiva, si consiglia di distribuire urgentemente **zolfo in polvere** su vegetazione asciutta e nelle ore più fresche della giornata. In alternativa allo zolfo e anche in miscela si possono utilizzare sia **bicarbonato di potassio** (es. *Armcarb 85*, *Karma 85*) che **laminarina** (*Vacciplant*), consentiti anche in bio.


BOTRITE – la pressione del patogeno è bassa; gli interventi con prodotti rameici o alcuni antiodici per la difesa risultano sufficienti a contenere il patogeno.

TIGNOLETTA E TIGNOLA RIGATA – questa settimana le catture sono praticamente assenti, sia per tignoletta sia per rigata. E' possibile visualizzare l'andamento delle catture ed i riferimenti alla scheda tecnica al link: <https://tinyurl.com/RLcattureGE>

MAL DELL'ESCA E VIROSI – nel periodo estivo è possibile notare segni di virosi e di mal dell'esca. La virosi più facilmente osservabile è l'**accartocciamento fogliare**, che determina decolorazioni delle foglie a partire da quelle basali, di colore rossastro (cv a bacca rossa) o giallo (cv a bacca bianca). Per il mal dell'esca i sintomi caratteristici sono aree clorotiche sulle lamine fogliari, con tendenza ad aumentare di dimensione e a seccare, mentre i tessuti fogliari lungo le nervature rimangono verdi (cosiddetta **tigratura**) e i tralci avvizziscono e seccano. Per entrambe le patologie è opportuno segnare le piante sintomatiche ora, così da poterle estirpare successivamente.

AZIENDE BIOLOGICHE – contro l'oidio mantenere la copertura con **zolfo bagnabile** o liquido ad alto dosaggio, alternando preferibilmente con **zolfo in polvere**. In alternativa allo zolfo è possibile utilizzare **bicarbonato di potassio** (es. *Armcarb 85*, *Vitikappa*, *Karma 85*) che ha anche un effetto antibotritico. Per peronospora, solo in previsione di pioggia è opportuno rinnovare la copertura con rame, eventualmente associando prodotti ad azione complementare a largo spettro, anche per ridurre il dosaggio (es. corroboranti ed induttori di resistenza).

FENOLOGIA—rilievi del 18/07



STADIO FENOLOGICO
79 chiusura grappolo
81 inizio invaiatura

In **costa** e nelle zone più calde del **primo entroterra** la maggior parte dei grappoli ha raggiunto la fase di invaiatura (BBCH81); permangono situazioni in cui tale fase non è stata ancora raggiunta.

Nelle **zone interne** la fase prevalente è ancora la BBCH79 (chiusura grappolo), ma in alcuni vitigni si possono osservare i primi grappoli già completamente invaiati.

Foto Dr. L. Calcagno: *Bianchetta a Genova*



Maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite al link:

http://bit.ly/BBCH_Vite2019

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE, PERONOSPORA della VITE, TIGNOLETTA e BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022. Link: <https://tinyurl.com/RLoidio> - <http://bit.ly/RLperonospora> - <https://bit.ly/RL-tignoletta> e <https://tinyurl.com/botrite>

Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- Tignoletta: <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>
- Botrite: <https://tinyurl.com/RLcommbotrite>

IRRIGAZIONE – Situazione aggiornata e apporti idrici consigliati al link <https://bit.ly/RLirrigazione>. Prima di procedere con interventi irrigui è opportuno verificare le previsioni meteo (<https://tinyurl.com/previsioniARPAL>) ed eventuali limitazioni previste da ordinanze locali.

>> Dichiarato lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÀ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria: è vietato l'abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto <https://tinyurl.com/RLincendi>