



REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 13 del 09/06/2022 - IMPERIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




TENDENZA


GIORNO	12/06/2022	13/06/2022
PREVISIONE	Soleggiato	Sereno
TEMPERATURE	stazionarie	stazionarie
INTENSITÀ VENTI	deboli	deboli
AFFIDABILITÀ	Media	Media

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdf/WS/bollettinoLiguria.pdf>

Le temperature massime hanno avuto andamenti altalenanti nei diversi areali, con quello di Ranzo che ha registrato valori molto più bassi degli altri (es. 24°C contro i 30°C di Diano Castello). A fine periodo c'è stata comunque una normalizzazione tra i 27°C e i 30°C. Minime costanti con valori intorno ai 18°C tranne che per l'areale di Diano Castello che ha registrato una media di 21°C. Precipitazioni scarse e concentrate per la maggior parte il giorno 3/6, con cumulati che non hanno neanche superato i 3 mm.



FENOLOGIA—rilievi del 06/06



Zone costiere: gli acini stanno raggiungendo la dimensione del grano di pepe (BBCH73).

Zone Interne: le piante sono in fase di allegagione (BBCH71).

Zone montane: si osservano i bottoni fiorali ben distanziati e in alcune piante sta iniziando la fioritura.

Foto Agt. D. Passaniti: Vermentino a Diano Castello

Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite
http://bit.ly/BBCH_Vite2019



Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE, PERONOSPORA della VITE e TIGNOLETTA** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022. Link: <https://tinyurl.com/RLoidio> <http://bit.ly/RLperonospora> e <https://bit.ly/RL-tignoletta>
Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- Tignoletta: <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>

E' stata recentemente revisionata la **SCHEDA TECNICA BOTRITE**. Link: <https://tinyurl.com/botrite> con il relativo elenco dei commerciali ammessi: <https://tinyurl.com/RLcommbotrite>

>> **Giornate fitopatologiche 2022** info ed iscrizioni al link: <http://www.giornatefitopatologiche.it>

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA – La pressione del fungo è molto modesta nella fascia costiera e di primo entroterra, mentre risulta un po' più elevata nelle zone interne, per la presenza di bagnature fogliari notturne.

Al momento comunque non si segnalano infezioni primarie e le condizioni meteo non sono favorevoli allo sviluppo del fungo; nelle aree interne e montane più a rischio per temporali e bagnature fogliari notturne prolungate, è opportuno mantenere protetta la vegetazione con prodotti **rameici** e miscele a bassa dilavabilità e maggior persistenza quali: **fosfiti/fosfonati, dimetomorf, ametoctratina, zoxamide o oxathiapiprolin**.

OIDIO - Su tutto il territorio provinciale si consiglia di potenziare la difesa antioidica utilizzando alternativamente zolfo in polvere e zolfo bagnabile, addizionato eventualmente con prodotti sistemici tradizionali dotati di azione preventiva come il **fluxapyroxad** (Sercadis) e il **cyflufenamid** (es. Cidely, Rebel Top). Questi prodotti sono soggetti a sviluppare resistenza al patogeno, pertanto è opportuno alternare il loro uso con lo zolfo o in miscela.

TIGNOLETTA E TIGNOLA RIGATA— è possibile visualizzare l'andamento delle catture al seguente link: <https://tinyurl.com/RLcattureIM>

AZIENDE BIOLOGICHE - Nelle aree costiere e primo entroterra si consiglia di prevenire lo sviluppo dell'oidio con solforazioni alternate a trattamenti con zolfo bagnabile, eventualmente da abbinare ad olio essenziale di arancio (es. Prevam Plus) o in alternativa **bicarbonato di potassio** (es. Armicarb). Nelle aree interne abbinare al trattamento antioidico un prodotto rameico; in alternativa o ad integrazione di rame e zolfo è possibile utilizzare prodotti coadiuvanti o corroboranti.

FLAVESCENZA DORATA - Per chi non avesse ancora eseguito il trattamento contro lo scafoideo è ancora possibile effettuarlo secondo le indicazioni del precedente bollettino. Elenco dei commerciali ammessi al link: <https://tinyurl.com/RLcommscafoideo>

POTATURA VERDE—nelle **zone costiere** si raccomanda di arieggiare la fascia grappoli mediante sfogliatura (le foglie poste in ombra), di eseguire una sfemminellatura sempre in zona grappoli e, dove necessario, cimature. Ricordiamo che queste operazioni che interessano la fascia grappolo favoriscono il microclima, riducono lo sviluppo di patologie (oidio e botrite) e migliorano l'efficacia della difesa fitosanitaria.

IRRIGAZIONE— Prosegue il progressivo esaurimento delle riserve idriche; i modelli di stima dei fabbisogni mettono in evidenza la necessità di valutare interventi in terreni sabbiosi, medio impasto ed anche argillosi. Maggiori dettagli alla pagina dedicata al consiglio irriguo sul SIA: <https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Irrigazione>