


REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 15 del 23/06/2022 - IMPERIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



TENDENZA


GIORNO	26/06/2022	27/06/2022
PREVISIONE	Soleggiato	Soleggiato
TEMPERATURE	In deciso aumento	In ulteriore aumento
INTENSITÀ VENTI	Deboli o moderati	Moderati o forti
AFFIDABILITÀ	Bassa	Bassa

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdf/WS/bollettinoLiguria.pdf>

Le temperature massime hanno avuto un andamento altalenante, con un incremento a metà periodo che ha portato areali come Dolceacqua a

raggiungere quasi 35°C, per poi calare fino a 27-30°C. Minime costanti, con un lieve aumento il 18/6 fino a 22°C ma in generale contenute in un range tra 18 e 21°C.


Precipitazioni praticamente assenti.



FENOLOGIA—rilievi del 20/06

STADIO FENOLOGICO	
73	Acini come un grano di pepe
75	Acini della misura di un pisello
77	Inizio chiusura grappolo

VITIGNO	
■	ROSSESE DOLEACQUA
◆	ORMEASCO
●	VERMENTINO
▲	PIGATO



Zone costiere: gli acini iniziano a tocarsi e alcune piante sono in fase di inizio chiusura grappolo (BBCH77).

Zone Interne: gli acini hanno la dimensione di un pisello (BBCH75).

Zone montane: gli acini hanno la misura di un grano di pepe (BBCH73).

Foto Agt. D. Passaniti: Vermentino a Pontedassio

Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite

http://bit.ly/BBCH_Vite2019



POTATURA VERDE—Si raccomanda di arieggiare la zona grappoli mediante sfogliatura (le foglie poste in ombra, evitando di esporre troppo il grappolo a irraggiamento diretto) e di eseguire sfemminellatura e cimature.

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE** **OIDIO DELLA VITE**, **PERONOSPORA** della VITE, **TIGNOLETTA** e **BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022. Link:

<https://tinyurl.com/RLoidio> - <http://bit.ly/RLperonospora> -

<https://bit.ly/RL-tignoletta> e <https://tinyurl.com/botrite>

Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- Tignoletta: <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>
- Botrite: <https://tinyurl.com/RLcommbotrite>

>> Dichiarato lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÀ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria: è vietato l'abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto <https://tinyurl.com/RLincendi>

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA – La pressione del fungo è nulla per la fascia costiera e primo entroterra, bassa per le zone interne e montane.

Da segnalare moderate bagnature fogliari notturne nei versanti interni della provincia e nelle aree montane in cui, in alcuni sporadici casi, è possibile notare occasionalmente alcune macchie su foglia e su acini (*peronospora larvata*); si consiglia quindi di rinnovare la copertura in previsione di rovesci temporaleschi con prodotti rameici e miscele a bassa dilavabilità e maggior persistenza quali: **fosfiti/fosfonati** e **zoxamide**.

OIDIO - Le alte temperature hanno limitato gli attacchi circoscritti alle sole porzioni di vigneto più in ombra e poco ventilate.

Occorre mantenere alta l'attenzione soprattutto in previsione di aumento dell'umidità atmosferica. E' possibile allungare i tempi di copertura nelle zone costiere, mentre per le zone interne e montane mantenere la protezione e rinnovarla ogni 6-7 giorni per lo zolfo in polvere e/o bagnabile e ogni 12-14 giorni per i prodotti sistemici.

TIGNOLETTA E TIGNOLA RIGATA— è possibile visualizzare l'andamento delle catture e la scheda tecnica con indicazioni per eventuali interventi al link: <https://tinyurl.com/RLcattureIM>

BOTRITE— Le condizioni meteo continuano ad essere sfavorevoli per il patogeno e le operazioni di potatura verde eseguite nella fascia produttiva, assieme eventualmente all'utilizzo di prodotti rameici o alcuni antioidici per la difesa, contribuiscono contenere il patogeno.

AZIENDE BIOLOGICHE - Nelle aree costiere e primo entroterra si consiglia di prevenire lo sviluppo dell'oidio con solforazioni alternate a trattamenti con zolfo bagnabile eventualmente da abbinare ad olio essenziale di arancio (*Prev-am Plus*) o in alternativa bicarbonato di potassio. Nelle aree interne e montane abbinare al trattamento antioidico un prodotto rameico. In alternativa o ad integrazione di rame e zolfo è possibile utilizzare prodotti coadiuvanti o corroboranti.

VIROSI E GIALLUMI—Si ricorda che in questo periodo è possibile notare nei vigneti piante con vegetazione stentata, colpite da virus e giallumi. Pertanto si consiglia, per entrambe le patologie, di **segnare** le piante sintomatiche, così da poterle estirpare successivamente.

IRRIGAZIONE— I modelli di stima dei fabbisogni evidenziano la necessità di irrigare in ogni tipo di terreno e in tutte le zone viticole provinciali, sebbene in modo diversificato. Tenere conto di eventuali ordinanze comunali. Maggiori dettagli alla pagina dedicata al consiglio irriguo sul SIA: <https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Irrigazione>