


BOLLETTINO VITE n° 17 del 7/07/2022 - IMPERIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




TENDENZA

GIORNO	10/07/2022	11/07/2022
PREVISIONE	Soleggiato	Variabilità
TEMPERATURE	Stazionarie	In aumento
INTENSITÀ VENTI	Deboli	Deboli o moderati
AFFIDABILITÀ	Media	Bassa

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdf/WS/bollettinoLiguria.pdf>

Le temperature massime hanno registrato un aumento nella prima parte del periodo in esame, passando da circa 27°C fino a superare i 33°C e rimanere poi costanti.

Minime che hanno avuto un andamento più lineare (in particolar modo Diano Castello), eccezion fatta per un lieve aumento in data 3/7 che le ha portate da una media di 18°C fino a poco meno di 21°C. Precipitazioni praticamente assenti.



FENOLOGIA—rilevi del 4/07

Zone costiere: la fase fenologica di chiusura grappolo è stata raggiunta in tutti i vitigni e nei vitigni precoci come il Rossese è possibile osservare occasionalmente i primi grappoli che cambiano colore.

Zone Interne: anche nelle aree interne la fase fenologica prevalente è chiusura grappolo (BBCH 79)

Zone montane: la fase fenologica prevalente è quella in cui gli acini hanno raggiunto la dimensione di un pisello (la BBCH 75).




Foto Agt. D. Passaniti: Rossese a Dolceacqua

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE** **OIDIO DELLA VITE**, **PERONOSPORA** della VITE, **TIGNOLETTA** e **BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022. Link:

<https://tinyurl.com/RLoidio> - <http://bit.ly/RLperonospora> - <https://bit.ly/RL-tignoletta> e <https://tinyurl.com/botrite>

Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- Tignoletta: <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>
- Botrite: <https://tinyurl.com/RLcommbotrite>

LOTTA OBBLIGATORIA - FLAVESCENTZA DORATA DELLA VITE

I trattamenti devono essere eseguiti nei seguenti comuni: Villa Fardali, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Diano San Pietro, Diano Castello, Diano Marina, Diano Arentino, Cesio, Caravonica, Aurigo, Borgomaro, Chiusanico, Chiusavecchia, Lucinasco, Pontedassio e Imperia (classificati zone focolaio) e Aquila d'Arrosia, Ranzo, Borghetto d'Arrosia, Vessalico, Armo, Pieve di Teco, Pornassio, Cosio d'Arrosia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Rezzo (classificati zone di insediamento).

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Non sono segnalate criticità fitosanitarie nel territorio provinciale, se non un generale aumento della presenza del black rot in diversi vigneti, anche se al momento le condizioni meteo stanno contenendo la sua diffusione e pericolosità.

PERONOSPORA – La pressione del fungo è nulla per le zone costiere e primo entroterra, risulta bassa per le zone montane.

La difesa per le zone costiere e interne è sospesa, rimane attiva per le aree montane, più soggette a rovesci temporaleschi. Rispettando il periodo di copertura e a scadenza della protezione del precedente trattamento, verificare condizioni meteo e posizionare il trattamento in previsione di piogge. I prodotti consigliati sono a base di **rame** eventualmente in abbinamento a prodotti specifici quali **fosfiti/fosfonati**, **zoxamide**, **cimoxanil**, **dimetomorf** e **oxathiapiprolin** (es. *Electis*, *Curzate R WG*, *Quasar R Flow*).

OIDIO - Nei vigneti posti in zona costiera e interna esenti da infezioni si possono allungare i tempi tra un trattamento e il successivo. Per i vigneti posti in zona montana è opportuno rinnovare la protezione ogni 6-7 giorni per lo zolfo in polvere e/o bagnabile e ogni 12-14 giorni per i prodotti sistemici.

MAL DELL'ESCA— in alcuni vigneti sono stati rilevati su foglia i caratteristici sintomi della malattia. Segnare le piante con sintomi.

TIGNOLETTA E TIGNOLA RIGATA— l'andamento delle catture ed i riferimenti alla scheda tecnica sono disponibili al link: <https://tinyurl.com/RLcattureIM>; si ricorda che i prodotti utilizzati per il secondo trattamento contro lo scafoideo contribuiscono al contenimento di tali lepidotteri.

FLAVESCENTZA DORATA: in questo periodo è **obbligatorio eseguire il secondo trattamento contro lo scafoideo** nei **Comuni** indicati nel box, utilizzando uno dei seguenti principi attivi: **acetamiprid** (es. *Epik SL*) o **etofenprox** (es. *Trebon up*), oppure **flupyradifurone** (*Sivanto*) avendo cura di bagnare bene anche la parte bassa delle piante. A salvaguardia degli insetti impollinatori, prima di intervenire, sfalcare le eventuali erbe spontanee fiorite sottostanti il vigneto.

AZIENDE BIOLOGICHE - In tutte le aree vitate si consiglia di effettuare un trattamento con zolfo bagnabile eventualmente da abbinare ad olio essenziale di arancio dolce (*Prev-am Plus*). Associare rame solo nelle aree montane in previsione di pioggia.

IRRIGAZIONE— Situazione aggiornata e apporti idrici consigliati al link <https://bit.ly/RLirrigazione>.

Prima di procedere con interventi irrigui è opportuno verificare le previsioni meteo (<https://tinyurl.com/previsioniARPAL>) ed eventuali limitazioni previste da ordinanze locali