


BOLLETTINO VITE n° 6 del 21/04/2022 - LA SPEZIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




TENDENZA

GIORNO	24/04/2022	25/04/2022
PREVISIONE	Pioggie moderate/forti	Variabilità
TEMPERATURE	in diminuzione	In aumento
INTENSITÀ VENTI	moderati o forti	deboli
AFFIDABILITÀ	Bassa	Bassa

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>

Le temperature massime hanno subito un brusco calo in data 16/04, passando da valori prossimi ai 27°C fino a circa 16°C (in particolar modo nell'areale di Riomaggiore), per poi risalire fino a 20°C,

valori questi più in media con il periodo. Minime che hanno seguito due strade separate: un calo lieve sugli areali della riviera con valori che sono rimasti intorno ai 12°C, mentre a Castelnovo si è partiti dai 9°C di inizio periodo fino a scendere a 5°C per poi risalire a valori in media con gli altri areali. Precipitazioni assenti.



FENOLOGIA—rilevi del 19/04

Le elevate temperature registrate durante la scorsa settimana hanno favorito lo sviluppo vegetativo anche nelle aree più interne del territorio. Lungo la **costa** la maggior parte dei vitigni bianchi e i principali vitigni rossi mostrano i grappolini fiorali in fase di sviluppo. Nelle **zone interne** la presenza di grappolini fiorali in formazione è più frequente nei principali vitigni rossi (*Merlot*, *Sangiovese*) e, negli areali più caldi, la vegetazione è prossima ai 10 centimetri di lunghezza. Nei terreni in pendenza continua ad evidenziarsi il divario tra lo sviluppo della vegetazione, più contenuto nei filari prossimi ai ciglioni e muretti e più esposti ai venti, in condizioni idriche meno favorevoli. **Val di Magra:** il *Vermentino* mostra 2-3 foglie distese e in alcune piante sono visibili i primi grappolini. Tutti i vitigni a bacca rossa hanno raggiunto i 10 cm e i grappolini sono ben visibili.




Foto CAAR: *Bosco 5 Terre*

Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite http://bit.ly/BBCH_Vite2019

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDA TECNICA OIDIO DELLA VITE** e **PERONOSPORA della VITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022. Link: <https://tinyurl.com/RLoidio> e <http://bit.ly/RLperonospora>

Elenchi aggiornati dei commerciali ammessi dal Disciplinare per:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Escoriosi: <https://tinyurl.com/RLcomesoriosi>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>

>> PSR 2014-2020. L'elenco di tutti i bandi aperti è disponibile al link: <https://tinyurl.com/bandiaperiti>

>> Sottomisura 4.4: ripristino dei muretti a secco: informazioni relative al bando al link <https://tinyurl.com/4anwz4vw>

>> Ristrutturazione e riconversione dei vigneti – campagna 2022/2023: informazioni su chi può beneficiare e sui requisiti alla pagina <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/contributi-per-la-viticultura/ristrutturazione-e-riconversione-dei-vigneti.html>

>> Euroflora 2022, 23 aprile - 8 maggio a Genova: info al link <https://euroflora.genova.it>

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Dai rilievi effettuati questa settimana non si sono evidenziati sintomi o criticità particolari; sono tuttavia previste precipitazioni che potrebbero innescare infezioni, considerando che in alcuni casi la vegetazione inizia ad essere recettiva.

ESCARIOSI: nelle aree colpite durante l'annata precedente e in vitigni sensibili come il *Vermentino*, se lo sviluppo del germoglio è di 5-7 cm è consigliabile prepararsi a trattare con **metiram o pyraclostrobyn** (es. *Polyram DF*, *Cabrio Top*) o **prodotti rameici**. Il **metiram** ha anche un effetto preventivo su peronospora e Black rot.

OIDIO: in tutta la costa e nelle aree di entroterra più calde le piante sono in una fase sensibile agli attacchi del fungo; considerando le prossime piogge è opportuno programmare la difesa, e nelle aree ad alto rischio è possibile intervenire con **zolfo** (indicativamente 15-20 kg/ha), **bagnabile o liquido** (400-600 g/hl), anche in abbinamento a **COS-OGA** (es. *Ibisco*) che agisce come elicitore delle difese naturali della pianta. Nei vigneti a basso rischio, dove la patologia non causa in genere problemi gravi, in caso di vegetazione sviluppata (almeno con tre foglie distese) è possibile utilizzare lo **zolfo a bassi dosaggi** (200-300 g/hl), o in alternativa l'olio di arancio dolce (*Prev-AM plus*), abbinabile anche allo zolfo, in questo caso con dosi di zolfo bagnabile a ettaro non superiori ai 2 kg. I trattamenti consigliati possono essere eseguiti anche da **aziende biologiche**. Al fine di limitare l'inoculo e la diffusione del patogeno è utile, soprattutto nelle zone a maggior sviluppo della vegetazione, eliminare i germogli basali.

PERONOSPORA: è opportuno monitorare la situazione in vista delle prossime piogge, che potrebbero favorire la maturazione delle spore svernanti, in presenza di temperature prossime o superiori ai 10°C e con germogli di circa 10 cm di sviluppo. Nelle aree più sensibili al patogeno e con maggior sviluppo della vegetazione, in particolare se a conduzione biologica, potrebbe essere opportuno effettuare un trattamento con rame, preferendo in questo periodo di variabilità meteorologica, la poltiglia bordolese.

SITUAZIONE IDRICA

In tutte le aree si è verificata una progressiva diminuzione delle riserve che dovrebbero essere almeno parzialmente ripristinate dalle precipitazioni previste nei prossimi giorni.