

BOLLETTINO VITE n° 9 del 12/05/2022 - LA SPEZIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




TENDENZA

GIORNO	15/05/2022	16/05/2022
PREVISIONE	Variabilità	Soleggiato
TEMPERATURE	stazionarie	in aumento
INTENSITÀ VENTI	deboli	deboli
AFFIDABILITÀ	Media	Media

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>

Le temperature massime hanno registrato un importante aumento a metà settimana, dove si è passati da valori intorno ai 16°C fino a 27°C. Anche le minime sono

aumentate dai 12°C di inizio periodo a circa 18°C, tranne nell'area lunese dove i valori si sono mantenuti pressoché costanti per tutto il periodo. Precipitazioni modeste che hanno di poco superato i 5 mm nei primi giorni in esame.



FENOLOGIA—rilievi del 09/05

In **costa** e nei versanti meglio esposti del **primo entroterra** le infiorescenze dei principali vitigni mostrano i bottoni fiorali ben separati o, come il *Vermentino*, stanno completando tale fase. Nei vitigni precoci, quali il *Bosco* tra i bianchi e *Merlot* e *Sangiovese* tra i rossi, le infiorescenze sono ormai completamente formate con i singoli fiori per lo più isolati e molto vicini all'apertura. Nelle zone **interne** la vegetazione è più contenuta ed i grappoli fiorali sono in rapido accrescimento (fase prevalente BBCH55). In **Val di Magra** i principali vitigni a bacca rossa si trovano nella fase fenologica BBCH57, in cui le infiorescenze sono pienamente visibili e i fiori tra di loro separati. La fenologia del *Vermentino* risulta invece più arretrata e le fasi prevalenti sono la BBCH 53 e la BBCH55 nei vigneti più sviluppati.




Foto CAAR: Sangiovese ad Arcola

Maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite al link
http://bit.ly/BBCH_Vite2019

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDA TECNICA OIDIO DELLA VITE** e **PERONOSPORA della VITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022. Link: <https://tinyurl.com/RLoidio> e <http://bit.ly/RLperonospora>

Elenchi aggiornati dei commerciali ammessi dal Disciplinare per:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Escoriosi: <https://tinyurl.com/RLcomesoriosi>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA – le recenti piogge hanno determinato in alcune zone condizioni favorevoli al patogeno e nei vigneti non trattati sono stati rilevati i primi sintomi su foglia. Considerato lo sviluppo delle piante, la prossimità alla fioritura, soprattutto in costa e nei vigneti più precoci, al termine del periodo di efficacia dell'eventuale precedente trattamento è opportuno mantenere protetta la vegetazione con prodotti specifici e a maggior persistenza. I prodotti utilizzabili in questa fase possono essere a base di **dimetomorf**, **cyazofamid**, **mandipropamid**, **fluopicolide**, **oxathiapiprolin** (es. *Forum*, *Quasar*, *Mildicut*, *Cuprofix*, *Ampexio*, *Zorvec vinabel*). E' importante attenersi sempre al numero massimo di interventi ammessi per principio attivo e alternare i prodotti. Per coloro che si trovassero con una vegetazione in forte sviluppo e senza alcun trattamento ancora eseguito, potrebbe essere opportuno utilizzare prodotti ad azione sistemica come **metalaxil M** abbinati a **rame** (es. *Ridomil Gold R*, *Flare Gold R*, *Mexil R*). Nelle aree più interne, dove la vegetazione è più contenuta è possibile utilizzare **fosetil-Al** o **fosfonati** abbinati a prodotti di copertura come **rame** (es. *Optix R*, *Erresei Bordeaux*, *Tutor*) o **metiram** (es. *Polyram DF*), soprattutto nel caso di vigneti soggetti a black rot ed escoriosi, in quanto assicura un'azione collaterale anche per tali patologie.

OIDIO - considerando la fase fenologica, è bene abbinare al trattamento antiperonosporico **zolfo bagnabile** o **liquido**, e nel caso di zone maggiormente soggette ad oidio e con vegetazione più sviluppata, prodotti specifici come **fluxapyroxad** (es. *Sercadis*) o ad azione sistemica come gli **IBE** (es. *Topas*, *Domark*, *Score*) anche per garantire un analogo periodo di efficacia.

AZIENDE BIOLOGICHE - mantenere protetta la vegetazione con prodotti a base di **rame** e **zolfo** bagnabile o liquido. In caso di aree particolarmente sensibili a oidio è possibile alternare i trattamenti liquidi con quelli con zolfo in polvere, eventualmente in miscela con zeolite, sostanza caratterizzata da elevata capacità di assorbimento dell'umidità.

GESTIONE VIGNETO: è opportuno procedere con le operazioni di gestione dei germogli (diradamento di quelli in sovrannumero, doppi o sterili) e di spollonatura in zona costiera e primo entroterra al fine di riequilibrare la pianta e migliorare l'efficacia dei trattamenti. Si consiglia inoltre, se non ancora fatto, di eseguire le operazioni di trinciatura o sfalcio delle erbe spontanee o l'interramento di eventuali leguminose.

>> **PSR 2014-2020. L'elenco di tutti i bandi** è disponibile al link <https://tinyurl.com/bandiaperti>
 >> **Sottomisura 17.1 Campagna assicurativa 2022.** Info al link <https://tinyurl.com/campagnaassicurativa>