


BOLLETTINO VITE n° 12 del 01/06/2022 - LA SPEZIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




TENDENZA

GIORNO	04/06/2022	05/06/2022
PREVISIONE	Velature ☀️	Soleggiato ☀️
TEMPERATURE	stazionarie	stazionarie
INTENSITÀ VENTI	deboli o moderati	deboli con brezze
AFFIDABILITÀ	Media	Media

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>

Le temperature massime hanno raggiunto valori compresi tra i 32°C e i 35°C all'inizio del periodo considerato, per poi subire un calo deciso

e attestarsi infine intorno ai 24-27°C. Simile l'andamento delle minime, che hanno raggiunto i 24°C nelle aree litoranee per poi scendere nei giorni successivi sino a 15-18°C. Irrisorie le precipitazioni del 29/5.




FENOLOGIA—rilevi del 30/05

In **costa** le elevate temperature hanno accelerato la fioritura in tutti i vitigni; nei principali rossi (**Sangiovese** e **Merlot**) si inizia ad osservare un evidente ingrossamento degli acini (BBCH73). In **entroterra** la fioritura si sta concludendo nei principali vitigni, tranne su **Vermentino** che alle quote più alte sta ora entrando in piena fioritura. In **Val di Magra** i principali vitigni rossi sono prevalentemente in fase di fine fioritura—allegagione (BBCH69/71); più eterogenea la situazione del **Vermentino**.
Foto CAAR: *Sangiovese ad Arco-la*

STADIO FENOLOGICO - BBCH

61-63	Inizio fioritura
65-67	Piena fioritura
69	Fine fioritura
71	Allegagione
73	Acini come un grano di pepe

VITIGNO	
★	CABERNET S.
◆	BOSCO
▲	ALBAROLA
▲	MERLOT
▲	SANGIOVESE
+	VERMENTINO



Maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite al link
http://bit.ly/BBCH_Vite2019

LOTTA OBBLIGATORIA - FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

In Liguria, secondo il Decreto dirigenziale n. 1947 del 03-07-2014 nel periodo compreso tra l'ultima settimana di maggio e la prima decade di giugno è obbligatorio il primo trattamento insetticida contro le forme giovanili dello *Scaphoideus titanus* nelle zone focolaio, di insediamento e in quelle indenni ad alto rischio. In provincia di La Spezia i trattamenti devono essere eseguiti nei seguenti comuni: **Sarzana** (zona focolaio); **Deiva Marina**, **Framura**, **Bonassola**, **Levanto**, **Monterosso al Mare**, **Vernazza**, **Riomaggiore**, **Borghetto di Vara**, **Beverino**, **Riccò del Golfo**, **La Spezia** e **Bolano** (zone di insediamento); **Follo**, **Vezzano Ligure**, **Santo Stefano Magra**, **Arcola**, **Lerici**, **Castelnuovo Magra**, **Luni** e **Ameglia** (classificati indenni ad alto rischio).

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE**, **PERONOSPORA della VITE** e **TIGNOLETTA** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022. Link: <https://tinyurl.com/RLoidio> <http://bit.ly/RLperonospora> e <https://bit.ly/RL-tignoletta>

Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- Tignoletta: <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA – la mancanza di piogge significative e le occasionali bagnature fogliari notturne hanno contenuto la diffusione di peronospora. Chi ha effettuato il trattamento a fine fioritura la scorsa settimana è ancora protetto; nei vigneti che stanno concludendo la fioritura, finita tale fase, è opportuno proteggere il grappolo con prodotti ad elevata affinità alle cere e lunga persistenza, ad esempio **amectotradina**, **fluopicolide** e **zoxamide** (quest'ultimo con effetto collaterale su botrite), eventualmente associati a prodotti rameici (es. **Enervin SC**, **Electis R Flow**). Nei vigneti con fioritura ancora in corso è possibile impiegare **zoxamide** abbinato ad un principio con azione sistemica, per aumentare la protezione della vegetazione in crescita, ad esempio **oxathiapiprolin** (es. **Zorvec Vinabel**) o **fosetyl alluminio**.

OIDIO – anche questa settimana l'oidio si è manifestato occasionalmente solo su foglie non protette; le elevate temperature previste nei prossimi giorni potrebbero contribuire a contenere il patogeno. Nei vigneti in cui la fioritura sta terminando, vista l'elevata sensibilità di questa fase e terminato il periodo di protezione del precedente trattamento, è possibile utilizzare prodotti specifici di lunga persistenza quali **metrafenone**, (es. **Vivando**) **cyflufenamid** (es. **Cidely**) o **azoxistrobin** (es. **Quadrin**), **trifloxistrobin** (es. **Flint**). Nelle aree interne utilizzare prodotti ad azione sistemica come gli **IBE** (es. **Topas**, **Domark**, **Score**) associati a zolfo a dosaggi medi. Porre attenzione al numero massimo di interventi ammessi per principio attivo ed eventualmente alternarli.

FLAVESCENZA DORATA – per chi non avesse ancora eseguito il trattamento contro lo scafoideo è ancora possibile effettuarlo secondo le indicazioni del precedente bollettino. Elenco dei commerciali ammessi al link: <https://tinyurl.com/RLcommscafoideo>

TIGNOLETTA— modeste al momento le catture di *Lobesia botrana*; ad inizio maggio sono state posizionate anche le trappole di **tignola rigata** (*Cryptoblabes gnidiella*) e dai rilievi delle ultime due settimane si osserva un progressivo aumento delle catture.

AZIENDE BIOLOGICHE: vista la sensibilità della fase fenologica attuale, una volta terminata la fioritura è opportuno mantenere protetta la vegetazione con prodotti a base di **rame** e **zolfo** bagnabile o liquido. In alternativa o ad integrazione del rame e dello zolfo si possono utilizzare prodotti coadiuvanti o corroboranti. Per la lotta a **flavescenza dorata** utilizzare prodotti a base di **piretro** dopo il tramonto (acidificando leggermente la soluzione) o di **azadiractina** (es. **Oikos**) o di **sali potassici di acidi grassi** (es. **Flipper**).

IRRIGAZIONE— Le precipitazioni sono state molto modeste e si continua a rilevare un progressivo esaurimento delle riserve idriche; i modelli di stima dei fabbisogni mettono in evidenza la necessità di valutare interventi in terreni sabbiosi e medio impasto. Maggiori dettagli alla pagina dedicata al consiglio irriguo sul SIA: <https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Irrigazione>

>> “**Vinum in Bolano**” Sabato 4 giugno dalle 17:00 alle 24:00; locandina al link <https://tinyurl.com/VinumBolano>