REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo

PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA

Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 16 del 30/06/2022 - LA SPEZIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov





TENDENZA

GIORNO	03/07/2022	04/07/2022
PREVISIONE	Sereno	Sereno
TEMPERATURE	In aumento	In aumento
INTENSITÀ VENTI	deboli	deboli
AFFIDABILITÀ	Media	Media

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su: https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf

Le temperature massime hanno registrato un aumento a metà periodo, passando da valori compresi tra 28 e 30°C fino a 36°C, per poi calare nell'ultima parte della settimana. Minime costanti intorno ai 21°C; anche qui registriamo un lieve aumento il 27/6. In data 28/6 si sono registrate precipitazioni importanti che hanno apportato un cumulato di ben 46 mm nell'areale delle Cinque Terre.



FENOLOGIA—*rilievi del 27/06*

In **costa** i grappoli sono completamente chiusi in tutti i vitigni, e la fase BBCH 79 è stata raggiunta anche dai vitigni tardivi, pur in presenza di moderata acinellatura. In **entroterra** la fase di chiusura grappolo è prossima al completamento in tutte le principali varietà, compreso le più tardive (*Vermentino*). **Val di Magra**: La maggior parte dei vitigni ha completato la chiusura del grappolo (BBCH79); leggermente più arretrata la fenologia del *Vermentino* in cui si osservano ancora piante che hanno appena iniziato la chiusura.

Foto CAAR: *Sangiovese a Sarzana*

Maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite al link http://bit.ly/BBCH_Vite2019



Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE**, **PERONOSPORA della VITE**, **TIGNOLETTA e BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022. Link: https://tinyurl.com/RLoidio - http://bit.ly/RLperonospora - https://bit.ly/RL-tignoletta e https://tinyurl.com/botrite

Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- Peronospora: https://tinyurl.com/RLcomperonospora
- Tignoletta: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta
- Botrite: https://tinyurl.com/RLcommbotrite

>> Dichiarato lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÁ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria: è vietato l'abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto https://tinyurl.com/RLincendi

>> Liguria da bere, La Spezia 1-3 luglio, info al link https://tinyurl.com/Liguriadabere

>> ONAV—Incontro sui vini delle Cinque Terre, 14 Luglio a Sarzana, locandina al link: https://tinyurl.com/2s4a5n7z

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA – le recenti piogge e le successive bagnature potrebbero aver favorito l'attività del patogeno; nel caso non si sia già intervenuti di recente, è opportuno rinnovare la protezione utilizzando **rame** anche in associazione a prodotti di maggiore persistenza quali **amectotradina** e **zoxamide** (*es. Enervin SC, Electis R Flow*) nelle zone di fondovalle o comunque più sensibili al patogeno.

OIDIO - al termine del periodo di copertura del precedente trattamento, rinnovare la protezione con zolfo bagnabile/liquido preferibilmente alternato a zolfo in polvere su vegetazione asciutta e nelle ore più fresche della giornata. Nelle aree più predisposte mantenere la protezione impiegando zolfo bagnabile o liquido associato a prodotti specifici di buona persistenza, eventualmente utilizzando **spiroxamina** in presenza di sintomi.

MAL DELL'ESCA—cominciano ad evidenziarsi su foglia i caratteristici sintomi della malattia, in tutti gli areali. Segnare le piante con sintomi.

BOTRITE– gli interventi con prodotti rameici o alcuni antioidici per la difesa, insieme alle operazioni di potatura verde, attualmente risultano misure sufficienti a contenere il patogeno.

TIGNOLETTA E TIGNOLA RIGATA – le catture di tignoletta sono in diminuzione, mentre per la tignola rigata si rileva una crescita, al momento comunque poco significativa; chi ha trattato può attendere la fine del periodo di efficacia del prodotto utilizzato (in caso di utilizzo di *Bacillus thuringiensis*, ripetere il trattamento a distanza di una settimana). Si ricorda che alcuni principi attivi utilizzabili per il secondo trattamento contro la cicalina vettore della flavescenza dorata (da effettuare nella prima decade di luglio circa) sono efficaci anche nei confronti della tignoletta. E' possibile visualizzare l'andamento delle catture ed i riferimenti alla scheda tecnica al link: https://tinyurl.com/RLcattureSP

AZIENDE BIOLOGICHE: per oidio è importante mantenere la copertura con **zolfo** bagnabile o liquido, alternando preferibilmente con zolfo in polvere. In alternativa allo zolfo è possibile utilizzare **bicarbonato di potassio** (*Armicarb 85, Karma 85 o Vitikappa*) che ha anche un effetto antibotritico, o, in assenza di sintomi **laminarina** (*Vacciplant*); in presenza invece di infezioni, utilizzare **olio essenziale di arancio dolce** (*Prev-am Plus*). Per peronospora dopo le recenti piogge è opportuno ripristinare la copertura con **rame**, anche in associazione a corroboranti (*es. zeolite*), che consentono di ridurne il dosaggio, aumentando al contempo la protezione del grappolo da marciumi.

IRRIGAZIONE— tenendo conto delle recenti precipitazioni, valutare la necessità di interventi, considerando le specifiche situazioni e la stima dei fabbisogni individuati alla pagina dedicata al consiglio irriguo sul SIA: https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Irrigazione

VIROSI E GIALLUMI—si ricorda che in questo periodo è possibile notare nei vigneti piante con vegetazione stentata, colpite da virosi e gialumi. Si consiglia di **segnare** le piante sintomatiche, in modo da poterle estirpare successivamente.

LABO-CAAR -Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - **tel** 0187.278770- **fax** 0187.278785

e-mail caarservizi@regione.liguria.it– **Web** www.agriligurianet.it, https://sia.regione.liguria.it

www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot