


BOLLETTINO VITE n° 17 del 7/07/2022 - LA SPEZIA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



TENDENZA


GIORNO	10/07/2022	11/07/2022
PREVISIONE	Soleggiato 	Variabilità 
TEMPERATURE	Stazionarie	In aumento
INTENSITÀ VENTI	Deboli	Deboli o moderati
AFFIDABILITÀ	Media	Bassa

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:



IN CAMPO

FENOLOGIA—rilevi del 4/07



In **costa** i grappoli sono completamente chiusi in tutti i vitigni (BBCH 79), compresi quelli più tardivi come il **Bosco**.

Nell'**entroterra** la fase di chiusura grappolo è stata raggiunta a tutte le quote nelle varietà a grappolo compatto (*Sangiovese*) e risulta in fase avanzata di chiusura anche nelle varietà tardive (*Vermentino*).

Val di Magra: questa settimana anche il *Vermentino* ha completato nella maggior parte dei vigneti la fase di chiusura grappolo e pertanto tutti i vitigni sono nella fase fenologica BBCH79. In alcune piante di *Merlot* si segnalano i primissimi acini che iniziano ad invaiare.

Foto CAAR: *Albarola* a Levante

Maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite al link:

http://bit.ly/BBCH_Vite2019

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE, PERONOSPORA della VITE, TIGNOLETTA e BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022. Link: <https://tinyurl.com/RLoidio> - <http://bit.ly/RLperonospora> - <https://bit.ly/RL-tignoletta> e <https://tinyurl.com/botrite>

Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- Tignoletta: <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>
- Botrite: <https://tinyurl.com/RLcombotrite>

IRRIGAZIONE— Situazione aggiornata e apporti idrici consigliati al link <https://bit.ly/RLirrigazione>.

Prima di procedere con interventi irrigui è opportuno verificare le previsioni meteo (<https://tinyurl.com/previsioniARPAL>) ed eventuali limitazioni previste da ordinanze locali

>> **ONAV**—Incontro sui vini delle Cinque Terre, 14 Luglio a Sarzana, locandina al link: <https://tinyurl.com/2s4a5n7z>

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA – l'attuale fase caratterizzata da elevate temperature continua a essere sfavorevole al patogeno e non rende necessari trattamenti, in mancanza di piogge significative. Considerando l'avanzata fase fenologica, in previsione di pioggia si consiglia di impiegare prodotti **rameici** alla dose minima di etichetta.

OIDIO - permane un rischio abbastanza alto in alcune aree, come confermato anche da modelli previsionali. I sintomi, in alcune zone sensibili, sono in lieve aumento, pertanto è consigliabile mantenere protetta la vegetazione e in particolare i grappoli con **zolfo** bagnabile o liquido ad alto dosaggio. In caso di infezione attiva, si consiglia di distribuire lo **zolfo in polvere** urgentemente su vegetazione asciutta e nelle ore più fresche della giornata, oppure, rispettando il numero massimo consentito di interventi, anche **spiroxamina**. In alternativa allo zolfo e anche in miscela si possono utilizzare sia **bicarbonato di potassio** (es. *Armicarb, Karma*) che **laminarina** (*Vacciplant*), consentiti anche in agricoltura biologica.

BOTRITE – considerando l'andamento meteo attuale, gli interventi con prodotti rameici o alcuni antioidici e le operazioni di potatura verde, non si consigliano interventi specifici.

TIGNOLETTA E TIGNOLA RIGATA – praticamente assenti le catture di tignoletta, continua la crescita di quelle di tignola rigata; si ricorda che i prodotti utilizzati per il secondo trattamento contro lo scafoideo contribuiscono al contenimento di tali lepidotteri. E' possibile visualizzare l'andamento delle catture ed i riferimenti alla scheda tecnica al link:

<https://tinyurl.com/RLcattureSP>

FLAVESCENZA DORATA: in questo periodo è **obbligatorio eseguire il secondo trattamento contro lo scafoideo** nei **Comuni** indicati nel box, utilizzando uno dei seguenti principi attivi: **acetamiprid** (es. *Epik SL*) o **etofenprox** (es. *Trebon up*), oppure **flupyradifurone** (*Sivanto*) avendo cura di bagnare bene anche la parte bassa delle piante. A salvaguardia degli insetti impollinatori, prima di intervenire, sfalcare le eventuali erbe spontanee fiorite sottostanti il vigneto.

AZIENDE BIOLOGICHE: contro l'oidio mantenere la copertura con **zolfo** bagnabile o liquido, alternando preferibilmente con zolfo in polvere. In alternativa allo zolfo è possibile utilizzare **bicarbonato di potassio** (es. *Armicarb 85, Vitikappa, Karma 85*) che ha anche un effetto antibotritico. Per peronospora, solo in previsione di pioggia è opportuno rinnovare la copertura con rame, eventualmente associando prodotti ad azione complementare a largo spettro, anche per ridurre il dosaggio (es. corroboranti ed induttori di resistenza).

LOTTA OBBLIGATORIA - FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Comuni: **Sarzana** (classificato zona focolaio); **Deiva Marina, Framura, Bonassola, Levante, Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore, Borghetto di Vara, Beverino, Riccò del Golfo, La Spezia e Bolano** (classificati zone di insediamento); **Follo, Vezzano Ligure, Santo Stefano Magra, Arcola, Lerici, Castelnovo Magra, Luni e Ameglia** (classificati indenni ad alto rischio).