


BOLLETTINO VITE n° 12 del 01/06/2022 - SAVONA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



TENDENZA

GIORNO	04/06/2022	05/06/2022
PREVISIONE	Velature ☀️	Soleggiato ☀️
TEMPERATURE	stazionarie	stazionarie
INTENSITÀ VENTI	deboli o moderati	deboli con brezze
AFFIDABILITÀ	Media	Media

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdf/WS/bollettinoLiguria.pdf>



FENOLOGIA—rilevi del 30/05



Zone costiere: tutti i vitigni sono in allegagione (BBCH71).

Zone Interne: le piante sono prevalentemente in piena fioritura e, in situazioni a fenologia più avanzata, si avviano alla conclusione (BBCH69).

Foto Agt. D. Passaniti: Lumassina a Noli

Maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite al link http://bit.ly/BBCH_Vite2019



IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA – Non si segnalano infezioni primarie e le condizioni meteo non sono favorevoli allo sviluppo del fungo, fatta eccezione per le aree interne in cui si rilevano bagnature fogliari notturne; si consiglia in queste aree di verificare le condizioni meteorologiche, di prestare attenzione all'inizio della fioritura e, se non coperti dal trattamento precedente, intervenire prima dell'apertura dei bottoni fiorali, mantenendo protetta la vegetazione con prodotti e miscela a bassa dilavabilità e maggior persistenza quali: **fosfiti/fosfonati**, **dimetomorf**, **ametocetrina**, **zoxamide** (quest'ultimo con effetto collaterale su botrite), **fluopicolide**, **cyazofamid** o **oxathiapiprolin** (es. *Mildicut*, *Enervin*, *Zorvec Vinabel*). Nelle altre zone, a fine fioritura e allegagione, è consigliabile, anche se non vi sono le condizioni predisponenti lo sviluppo del fungo, effettuare un trattamento con **rame** abbinato a zolfo bagnabile o liquido.

OIDIO – Si notano le prime infezioni su foglia e la pressione del fungo è elevata nelle aree costiere e primo entroterra, pertanto si raccomanda di aumentare il dosaggio dello zolfo bagnabile ed eventualmente abbinare o alternare a prodotti specifici come **le strobilurine**, **cyflufenamid** (es. *Cidely*) e **fluxapyroxad** (es. *Sercadis*), intervallando con zolfo in polvere. Nelle aree interne in abbinamento allo zolfo bagnabile è possibile aggiungere prodotti ad azione sistemica come gli **IBE** (es. *Scudex*, *Topas*, *Domark*, *Score*).

TIGNOLETTA— Modeste al momento le catture di *Lobesia botrana*; ad inizio maggio sono state posizionate anche le trappole di **tignola rigata** (*Cryptoblabes gnidiella*) e dai rilievi delle ultime due settimane si osserva un progressivo aumento delle catture.

AZIENDE BIOLOGICHE - Nelle aree interne effettuare il trattamento rameico in abbinamento allo zolfo bagnabile prima dell'entrata in fioritura della pianta; in alternativa o ad integrazione di rame e zolfo è possibile utilizzare prodotti coadiuvanti o corroboranti. Nelle altre aree si raccomanda di potenziare la difesa antioidica, riducendo il periodo tra un trattamento e il successivo, alternando lo zolfo bagnabile con zolfo in polvere; in alternativa utilizzare olio essenziale di arancio (*Prev-am Plus*) o bicarbonato di potassio, eventualmente da abbinare a basse dosi di zolfo bagnabile.

FLAVESCEZZA DORATA - per chi non avesse ancora eseguito il trattamento contro lo scafoideo è **ancora possibile effettuarlo** secondo le indicazioni del precedente bollettino (vedi box). Elenco dei commerciali ammessi al link: <https://tinyurl.com/RLcommscafoideo>

IRRIGAZIONE— Le precipitazioni sono state molto modeste e si continua a rilevare un progressivo esaurimento delle riserve idriche; i modelli di stima dei fabbisogni evidenziano criticità e possibili interventi in terreni sabbiosi e medio impasto. Maggiori dettagli alla pagina dedicata al consiglio irriguo sul SIA: <https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Irrigazione>

LOTTA OBBLIGATORIA - FLAVESCEZZA DORATA DELLA VITE

In Liguria, secondo il Decreto dirigenziale n. 1947 del 03-07-2014 nel periodo compreso tra l'ultima settimana di maggio e la prima decade di giugno è obbligatorio il primo trattamento insetticida contro le forme giovanili dello *Scaphoideus titanus* nelle zone focolaio, di insediamento e in quelle indenni ad alto rischio. I trattamenti devono essere eseguiti nei seguenti comuni: **Varazze, Cella Ligure, Albisola Marina, Albisola Superiore, Stella, Savona, Quiliano, Vado L., Bergeggi, Spotorno, Noli, Vezzi Portio, Orco Feglino, Calice L., Finale L., Borge Verezzi, Rialto, Tovo S. Giacomo, Giustenice, Pietra L., Loano, Boissano, Toirano, Balestrino, Borghetto S. Spirito, Ceriale, Albenga, Cisanò sul Neva, Arnasco, Vendone, Onzo, Ortovero, Casanova Lerrone, Garlanda, Villanova d'Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, Stellanello, Testico** (classificati zone di insediamento).

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE** e **PERONOSPORA della VITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022.

Link: <https://tinyurl.com/RLoidio> e <http://bit.ly/RLperonospora>

Elenchi aggiornati dei commerciali ammessi dal Disciplinare per:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>

E' disponibile la versione aggiornata della **SCHEDA TECNICA TIGNOLETTA DELLA VITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022. Link: <https://bit.ly/RL-tignoletta>