






REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA

Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 13 del 09/06/2022 - SAVONA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL-www.arpal.gov






Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su: https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf

Le temperature massime sono state altalenanti per tutto il periodo, passanvalori 🖁 da intorno ai 25°C fino a 30°C su tutti gli areali. Minime costanti, con un lieve



aumento a inizio periodo che ha portato i valori a stabilizzarsi su una media di 19°C. Precipitazioni che si sono concentrate, a livello di intensità, il giorno 8/6 con un cumulato che ha raggiunto, segnatamente per l'areale di Pietra Ligure, i 26 mm. Per il resto del periodo invece l'apporto di precipitazioni è stato minimo, con valori sempre inferiori ai 2 mm giornalieri.

FENOLOGIA-rilievi del 06/06



Zone costiere: gli acini hanno raggiunto la dimensione di un grano di pepe (BBCH73).

Zone Interne: le piante sono prevalentemente in fase allegagione (BBCH71).

Foto Agt. D. Passaniti: Granaccia a Quiliano



Maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite al link http://bit.ly/BBCH Vite2019

Sono disponibili le versioni aggiornate delle SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE, PERONOSPORA della VITE e TIGNOLETTA in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022. Link: https://tinyurl.com/RLoidio http://bit.ly/RLperonospora e https://bit.ly/RL-tignoletta Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: https://tinyurl.com/RLcomoidio
- Peronospora: https://tinyurl.com/RLcomperonospora
- Tignoletta: https://tinyurl.com/RLcomtignoletta

E' stata recentemente revisionata la SCHEDA TECNICA BOTRITE. Link: https://tinyurl.com/botrite con il relativo elenco dei commerciali ammessi: https://tinyurl.com/RLcommbotrite

>> Giornate fitopatologiche 2022: info ed iscrizioni al link: http:// www.giornatefitopatologiche.it

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

PERONOSPORA - la pressione del fungo è molto modesta nella fascia costiera e di primo entroterra, mentre risulta un po' più elevata per le zone interne, per la presenza di bagnature fogliari notturne.

Al momento comunque non si segnalano infezioni primarie, e le condizioni meteo non sono favorevoli allo sviluppo del fungo; nelle aree interne più a rischio per temporali e bagnature fogliari notturne prolungate, è opportuno mantenere protetta la vegetazione con prodotti *rameici* e miscele a bassa dilavabilità e maggior persistenza quali: fosfiti/ fosfonati, dimetomorf, ametoctratina, zoxamide o oxathiapiprolin In seguito alle piogge cadute ieri, che in limitate aree sono state anche consistenti, valutare l'effetto dilavamento ed eventualmente ripetere il trattamento dopo l'intervallo minimo di efficacia del precedente.

OIDIO - su tutto il territorio provinciale si consiglia di potenziare la difesa antioidica utilizzando alternativamente zolfo in polvere e zolfo bagnabile, addizionato eventualmente con prodotti sistemici tradizionali, dotati di azione preventiva come il fluxapyroxad (Sercadis) e il cyflufenamid (es. Cidely, Rebel Top). Questi prodotti sono soggetti a sviluppare resistenza al patogeno, pertanto è opportuno alternare il loro uso con lo zolfo o in miscela.

TIGNOLETTA E TIGNOLA RIGATA— è possibile visualizzare l'andamento delle catture al seguente link: https://tinyurl.com/RLcattureSV AZIENDE BIOLOGICHE - nelle aree costiere e primo entroterra si consiglia di prevenire lo sviluppo dell'oidio con solforazioni alternate a trattamenti con zolfo bagnabile, eventualmente da abbinare ad olio essenziale di arancio (es. Prevam Plus) o in alternativa bicarbonato di potassio (es. Armicarb). Nelle aree interne abbinare al trattamento antioidico un prodotto rameico; in alternativa o ad integrazione di rame e zolfo è possibile utilizzare prodotti coadiuvanti o corroboranti.

FLAVESCENZA DORATA - Per chi non avesse ancora eseguito il trattamento contro lo scafoideo è ancora possibile effettuarlo secondo le indicazioni del precedente bollettino. Elenco dei commerciali ammessi al link: https://tinyurl.com/RLcommscafoideo

POTATURA VERDE—nelle zone costiere si raccomanda di arieggiare la fascia grappoli mediante sfogliatura (le foglie poste in ombra), di eseguire una sfemminellatura sempre in zona grappoli e, dove necessario, cimature. Ricordiamo che queste operazioni che interessano la fascia grappolo favoriscono il microclima, riducono lo sviluppo di patologie (oidio e botrite) e migliorano l'efficacia della difesa fitosanitaria.

IRRIGAZIONE - Prosegue il progressivo esaurimento delle riserve idriche; i modelli di stima dei fabbisogni mettono in evidenza la necessità di valutare interventi in terreni sabbiosi, medio impasto ed anche argillosi. Maggiori dettagli alla pagina dedicata al consiglio irriguo sul

E' possibile evitare gli interventi irrigui nelle zone in cui le precipitazioni hanno superato i 10 mm.