


BOLLETTINO VITE n° 17 del 7/07/2022 - SAVONA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO


Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



TENDENZA


GIORNO	10/07/2022	11/07/2022
PREVISIONE	Soleggiato	Variabilità
TEMPERATURE	Stazionarie	In aumento
INTENSITÀ VENTI	Deboli	Deboli o moderati
AFFIDABILITÀ	Media	Bassa

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdf/WS/bollettinoLiguria.pdf>



FENOLOGIA—rilevi del 4/07

Zone costiere: la fase fenologica di chiusura grappolo è stata raggiunta in tutti i vitigni e nei vitigni precoci come il Rossese è possibile osservare i primi grappoli che cambiano colore.



Zone Interne: anche nelle aree interne la fase prevalente è la chiusura grappolo (BBCH 79), non raggiunta completamente solo in alcune piante di varietà Lumassina



Foto Agt. D. Passaniti: Pigato ad Albenga

Maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH vite al link
http://bit.ly/BBCH_Vite2019

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Non sono segnalate criticità fitosanitarie nel territorio provinciale, se non un generale aumento della presenza del black rot in diversi vigneti, anche se al momento le condizioni meteo stanno contenendo la sua diffusione e pericolosità.

PERONOSPORA – La pressione del fungo è nulla per le zone costiere e primo entroterra, risulta bassa per le zone interne.

La difesa per le zone costiere e primo entroterra è sospesa, rimane attiva nelle zone interne, più soggette a rovesci temporaleschi. Rispettando il periodo di copertura e a scadenza della protezione del precedente trattamento, verificare condizioni meteo e pianificare il trattamento in previsione di piogge. I prodotti consigliati sono a base di **rame** eventualmente in abbinamento a prodotti specifici quali **fosfiti/fosfonati, zoxamide, cimoxanil, dimetomorf e oxathiapropin** (es. *Electis, Curzate R WG, Quasar R Flow*).

OIDIO - Nei vigneti posti in zona costiera e primo entroterra esenti da infezioni si possono distanziare i tempi tra un trattamento e il successivo. Per i vigneti posti nelle zone interne rinnovare la protezione ogni 6-7 giorni per lo zolfo in polvere e/o bagnabile e ogni 12-14 giorni per i prodotti sistemici.

MAL DELL'ESCA— in alcuni vigneti sono stati rilevati su foglia i caratteristici sintomi della malattia. Segnare le piante con sintomi.

TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA— l'andamento delle catture ed i riferimenti alla scheda tecnica sono disponibili al link: <https://tinyurl.com/RLcattureSV>; si ricorda che i prodotti utilizzati per il secondo trattamento contro lo scafoideo contribuiscono al contenimento di tali lepidotteri.

FLAVESCENZA DORATA: in questo periodo è **obbligatorio eseguire il secondo trattamento contro lo scafoideo** nei **Comuni** indicati nel box, utilizzando uno dei seguenti principi attivi: **acetamiprid** (es. *Epik SL*) o **etofenprox** (es. *Trebon up*), oppure **flupyradifurone** (*Sivanto*) avendo cura di bagnare bene anche la parte bassa delle piante. A salvaguardia degli insetti impollinatori, prima di intervenire, sfalcare le eventuali erbe spontanee fiorite sottostanti il vigneto.

AZIENDE BIOLOGICHE - In tutte le aree vitate si consiglia di effettuare un trattamento con zolfo bagnabile eventualmente abbinabile ad olio essenziale di arancio dolce (*Prev-am Plus*). Associare rame solo nelle aree interne in previsione di pioggia.

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE, PERONOSPORA della VITE, TIGNOLETTA e BOTRITE** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2022. Link: <https://tinyurl.com/RLoidio> - <http://bit.ly/RLperonospora> - <https://bit.ly/RL-tignoletta> e <https://tinyurl.com/botrite>

Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- Tignoletta: <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>
- Botrite: <https://tinyurl.com/RLcombotrite>

LOTTA OBBLIGATORIA - FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

I trattamenti devono essere eseguiti nei seguenti comuni: **Varazze, Celle L., Albissola Marina, Albisola Superiore, Stella, Savona, Quiliano, Vado L., Bergeggi, Spotorno, Noli, Vezzi Portio, Orco Feglino, Calice L., Finale L., Boggio Verazzi, Rialto, Tovo S. Giacomo, Giustenice, Pietra L., Loano, Boissano, Toirano, Balestrino, Borghetto S. Spirito, Ceriale, Albenga, Cisano sul Neva, Arnasco, Vendone, Onzo, Ortovero, Casanova Lerrone, Garlanda, Villanova d'Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, Stellanello, Testico** (classificati zone di insediamento).

IRRIGAZIONE— Situazione aggiornata e apporti idrici consigliati al link <https://bit.ly/RLirrigazione>.

Prima di procedere con interventi irrigui è opportuno verificare le previsioni meteo (<https://tinyurl.com/previsioniARPAL>) ed eventuali limitazioni previste da ordinanze locali