


REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
PRODUZIONE INTEGRATA >> AMBITO VITICOLTURA
Monitoraggio Agro-Ambientale

BOLLETTINO VITE n° 21 del 04/08/2022 - SAVONA

PREVISIONI METEO—a cura di Arpal—www.arpal.gov

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov



TENDENZA


GIORNO	07/08/2022	08/08/2022
PREVISIONE	Variabilità	Nuvolosità variabile
TEMPERATURE	Stazionarie o in diminuzione	Stazionarie
INTENSITÀ VENTI	Moderati o forti	Moderati
AFFIDABILITÀ	Bassa	Bassa

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdf/WS/bollettinoLiguria.pdf>

SITUAZIONE METEO

Le temperature massime hanno subito molte oscillazioni, passando dai 30°C in media di inizio periodo fino a raggiungere i 35-36°C in

tutti gli areali in esame. Minime che hanno avuto anch'esse movimenti altalenanti ma meno evidenti, e che hanno comunque registrato un incremento tra inizio e fine periodo in media di 3°C. Si noti come l'area di Celle Ligure abbia raggiunto al massimo i 24°C mentre a Pietra Ligure si siano toccati i 27°C. Precipitazioni molto scarse, che non hanno superato i 3 mm di cumulo.



MATURAZIONE UVE (prelievi del 01/08/22)

COMUNE	VITIGNO	ZUCCHERI -°Brix		ALCOL PROB.LE - %		ACIDITA' - g/l		pH	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Albenga	Pigato	13,5	8,1	7,1	ND	11,15	27,25	2,97	2,59
	Rossese	8,5	6,4	ND	ND	21,63	32,52	2,79	2,55
	Vermentino	14,0	10,4	7,4	5,1	10,02	22,38	2,87	2,63
Finale Ligure	Barbarossa	12,9	6,0	6,7	ND	15,87	35,04	2,82	2,46
	Granaccia	15,3	8,0	8,3	ND	12,34	29,52	2,85	2,62
	Vermentino	13,8	6,6	7,3	ND	11,99	33,79	2,87	2,49
Noli	Lumassina	9,3	4,3	ND	ND	29,64	35,57	2,71	2,56
Ortovero	Pigato	13,6	8,1	7,2	ND	12,60	30,07	2,86	2,56
Quiliano	Granaccia	14,3	6,0	7,6	ND	9,07	30,40	3,01	2,60
	Lumassina	8,1	4,3	ND	ND	35,61	37,00	2,62	2,60
Medie		12,3	6,8	7,4	5,1	16,99	31,35	2,84	2,56

Come ogni anno, durante la prima settimana di agosto, sono stati effettuati campionamenti di uve dai vigneti della rete di monitoraggio in modo da avere un riferimento analitico all'inizio della maturazione. Come già era emerso dai rilievi fenologici, per l'anomalia climatica si conferma un netto anticipo di maturazione rispetto alla scorsa annata di circa 2 settimane. Infatti considerando la media tra tutti i campioni analizzati, si riscontra un accumulo del contenuto in zuccheri superiore di circa 5,5°Brix rispetto al 2021 e acidità inferiori di circa 14,4 g/l. Tra le situazioni più evolute si evidenzia la Granaccia a Finale con oltre 15 °Brix (8,3% di alcol probabile) mentre situazioni più arretrate le troviamo ovviamente per Lumassina a Quiliano ma anche per Rossese ad Albenga.

Dal confronto con le diverse annate, esaminando i dati disponibili in database da oltre 20 anni, risultano analogie con il 2003, 2007, 2017 e 2018. I prossimi campionamenti di uve verranno effettuati lunedì 8 agosto e potranno essere fornite ulteriori valutazioni.

SITUAZIONE FITOSANITARIA e GESTIONE VIGNETO

Non sono segnalate criticità su tutto il territorio provinciale.

PERONOSPORA - Nelle zone interne in mancanza di piogge e bagnature fogliari prolungate non vi sono le condizioni di sviluppo del fungo, pertanto sospendere i trattamenti e intervenire solo in occasione di piogge.


OIDIO - Anche nelle zone interne la difesa può ritenersi conclusa, in quanto ci troviamo in una fase fenologica poco sensibile al patogeno.

DROSOPHILA—(*Drosophila suzukii*) in particolare su vitigni sensibili con acini a buccia sottile come il Rossese questo insetto di recente introduzione può arrecare danni. Per maggiori informazioni su *Drosophila suzukii* consultare la scheda al link <http://bit.ly/Dsuzukii>

TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA - le catture sono in aumento soprattutto nel comune di Soldano e Dolceacqua; si consiglia quindi di intervenire con **spinetoram** (es. *Radiant pro*, *Fidelity*), che presenta una buona azione collaterale nei confronti di *Drosophila suzukii* o con **Bacillus thuringiensis** (es. *Dipel*, *Turex*, *Kristal*) quest'ultimo ammesso anche in bio. La difesa da tignoletta e Drosophila è finalizzata anche ad evitare danni agli acini che potrebbero diventare veicolo per la botrite o marciumi in generale.

L'andamento delle catture ed i riferimenti alla scheda tecnica di tignoletta sono disponibili al link: <https://tinyurl.com/RLcattureSV>.

IRRIGAZIONE— considerando l'attuale stadio fenologico, si consiglia di interrompere gli interventi. E' comunque importante osservare le specifiche situazioni e nel caso in cui si dovessero notare sintomi evidenti da siccità che potrebbero compromettere la maturazione, valutare eventuali interventi, tenendo presente limitazioni previste da ordinanze locali.



Granaccia a Quiliano