


BOLLETTINO VITE n° 13 del 08/06/2023 - GENOVA

PREVISIONI E SITUAZIONE METEO

Previsioni a cura di ARPAL—www.arpal.gov




TENDENZA

GIORNO	11/06/2023	12/06/2023
PREVISIONE	Possibili piogge	Deboli piogge
TEMPERATURE	In aumento	Stazionarie
INTENSITA' VENTI	Deboli	Deboli o moderati
AFFIDABILITA'	Bassa	Bassa

Per previsioni sempre aggiornate nei giorni successivi cliccare su:
<https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/bollettinoLiguria.pdf>

Le temperature massime, dopo un calo a inizio periodo, si sono mantenute intorno ai 24°C su tutto il territorio per poi risalire lievemente in data 7/6. Minime comprese tra 15°C e 18°C, con l'areale di levante che a inizio periodo ha registrato circa 2°C in più del ponente. Precipitazioni molto scarse, con cumulati che non hanno mai superato i 4 mm.




FENOLOGIA—rilievi del 05/06

Nelle **aree costiere** la fioritura è conclusa e nelle situazioni a fenologia più avanzata gli acini mostrano già la dimensione di un grano di pepe (BBCH73). Nell'**entroterra** si può osservare una situazione più eterogenea, con vitigni ancora in fase prevalente BBCH57 e aree in cui le piante sono in piena fioritura.

Foto Dr. L. Calcagno: Bianchetta a Campo di Ne a sx e Vermentino a Chiavari a dx

Per maggiori informazioni sulla scala fenologica BBCH http://bit.ly/BBCH_Vite2019



LOTTA OBBLIGATORIA - FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

In Liguria, secondo le prescrizioni del Decreto dirigenziale n. 1947 del 03-07-2014 nel periodo compreso tra l'ultima settimana di maggio e la prima decade di giugno è obbligatorio il primo trattamento insetticida contro le forme giovanili dello *Scaphoideus titanus*. Nella Città Metropolitana di Genova i trattamenti devono essere eseguiti nei seguenti comuni: **Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Sestri Levante, Né, Mezzanago, Lavagna, Chiavari, Leivi, Cogorno, Carasco, S. Colombano Certenoli, Genova, Sant'Olcese, Serra Riccò, Ceranesi** (zone di insediamento).

Sono disponibili le versioni aggiornate delle **SCHEDE TECNICHE OIDIO DELLA VITE, PERONOSPORA della VITE e TIGNOLETTA** in linea con quanto previsto dal Disciplinare 2023. Link: <https://tinyurl.com/RLoidio> <http://bit.ly/RLperonospora> e <https://bit.ly/RL-tignoletta>

Relativi elenchi dei commerciali ammessi:

- Oidio: <https://tinyurl.com/RLcomoidio>
- Peronospora: <https://tinyurl.com/RLcomperonospora>
- Tignoletta: <https://tinyurl.com/RLcomtignoletta>

E' stata recentemente revisionata la **SCHEDE TECNICA BOTRITE**. Link: <https://tinyurl.com/botrite> con il relativo elenco dei commerciali ammessi: <https://tinyurl.com/RLcombotrite>

COMUNICAZIONI—Regione Liguria, in attuazione del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027, ha aperto sotto condizione i bandi per la presentazione delle domande relative agli interventi **ACA5 (Inerbimento delle colture arboree), ACA21 (Gestione dei residui di potatura) e ACA25 (Tutela oliveti a valenza ambientale e paesaggistica)**. Gli interventi prevedono il rispetto degli impegni per 5 anni e la possibilità di ricevere un premio a superficie (scadenza prorogata al 15/06/23). Per informazioni sui premi e altri dettagli si rimanda al sito www.agriligurianet.it

-E' possibile presentare la **domanda di aiuto** per i danni causati dalla **siccità 2022**; info al link <https://www.agriligurianet.it/aiuti-siccita.html>

IN CAMPO

SITUAZIONE FITOSANITARIA OIDIO: in **costa**, terminato il periodo di protezione del precedente trattamento, utilizzare prodotti specifici di lunga persistenza quali **metrafenone, cyflufenamid e strobiruline** (es. *Vivando, Cidely, Rebel Top, Flint*) questi ultimi con azione collaterale contro black rot. Nelle **aree più interne**, una volta conclusa la fioritura, è possibile intervenire con **zolfo** associato a **IBE** (es. *Domark, Scudex, Revysion, Sercadis*) o **metrafenone** (*Vivando*), **cyflufenamid** (es. *Cidely*) e **strobiruline** (es. *Flint*), tenendo sempre presente il principio dell'alternanza delle sostanze attive.

PERONOSPORA: nei vigneti in costa e primo entroterra con fenologia molto avanzata (grano di pepe—BBCH73) è possibile proteggere la vegetazione con **rame**, anche in miscela con **fosetyl-AI e fosfonati** (es. *R6 Erresei Bordeaux, Optix R Dispers*). Nelle aree interne, una volta conclusa la fioritura, utilizzare miscele contenenti prodotti citotropici/translaminari con elevata protezione del grappolo quali **dimetomorf, fluopicolide, oxathiapiprolin, mandipropamide** da abbinare a **fosetyl-AI e fosfonati** o prodotti di copertura particolarmente persistenti come **ametocradina e zoxamide**, quest'ultimo con effetto collaterale contro i **marciumi**. (es. *R6 Erresei Albis, Ampexio, Zorvec Vinabel*).

BOTRITE— solo per i vigneti della costa che hanno concluso la fioritura e in particolare per la **Bianchetta**, è necessario effettuare un primo trattamento utilizzando prodotti a base di **fludioxonil e cyprodinil** (es. *Switch*). Inoltre in un'ottica di riduzione dei trattamenti, risultano molto efficaci per limitare tale patologia gli interventi di **sfogliatura in zona grappolo** (vedi box sotto).

TIGNOLETTA e TIGNOLA RIGATA - nulle al momento le catture.
FLAVESCENZA DORATA - per chi non avesse ancora eseguito il trattamento contro lo scafoideo è **ancora possibile effettuarlo** secondo le indicazioni del precedente bollettino. Elenco dei commerciali ammessi al link: <https://tinyurl.com/RLcommscafoideo>

Sono inoltre disponibili, a cura del Servizio fitosanitario nazionale, le **linee guida per il contrasto della flavescenza dorata** al link: <https://www.protezionedellepiante.it/lineeguida.pdf>

AZIENDE BIOLOGICHE: mantenere protetta la vegetazione, evitando i trattamenti in fioritura, con prodotti a base di **rame e zolfo** bagnabile o liquido. In alternativa o a integrazione del rame e dello zolfo si possono utilizzare prodotti coadiuvanti o corroboranti. Per la lotta a **flavescenza dorata**, è possibile utilizzare prodotti a base di **piretro** dopo il tramonto (acidificando leggermente la soluzione), di **azadiractina** (es. *Oikos*), **sali potassici di acidi grassi** (es. *Flipper*) e **olio di arancio** (es. *Prev-AM Plus*).

POTATURA VERDE— considerando il forte sviluppo delle vegetazione si raccomanda di arieggiare la fascia grappolo mediante **sfogliatura** (le foglie poste in ombra), di eseguire una **sffemminellatura** sempre in zona grappoli e, dove necessario, cimature; queste operazioni che interessano la fascia grappolo favoriscono il microclima, riducono lo sviluppo di patologie (oidio e botrite) e migliorano l'efficacia della difesa fitosanitaria.

SITUAZIONE IDRICA

Emergono in alcune aree situazioni critiche che coinvolgono i terreni sabbiosi e di medio impasto. Maggiori dettagli alla pagina dedicata al consiglio irriguo sul SIA: <https://bit.ly/RLirrigazione>.